

Geografiske begrænsninger

- Vækstsæsonen

Institutionelle begrænsninger

- Gødskning

Biologiske begrænsninger

- Grønsagernes næringsoptagelsesforløb




- Fiberdug og plast
- Tunneldyrkning
- Opsætning bede efteråret
- Overvintrende grønsager
- Etablering i en stående afgrøde

- Ikke vinterfaste fangafgrøder etableret i rabarber (4/8)
- Porre etableret i salat inden høst.
- Grøngødning/fangafgrøder etableret i knoldselleri på 3 tidspunkter
- Halm/fangafgrøder/have-park-kompost som kvælstoffælde
- Etablering af grøngødning i græskar, knoldselleri og rødbede

# HortiAdvice Knoldselleri og grøngødning

---



- Forfrugt kløvergræs
- 30 tons dybstrøelse
- Vintervikke/rug blanding, 22 kg/ha i én række mellem knoldene
- 20/7, 4/8, 17/8, kontrol uden vikke/rug
- Efterafgrøde målt den 25.oktober



# HortiAdvice Knoldselleri og grøngødning

---

2018	Efterafgrøde	Biomasse		N-akk.
		kg/ha		kg/ha
	20-jul	14.633	243%	70
	04-aug	9.833	163%	47
	17-aug	6.033	100%	29
	ingen	-	0%	-

2018	Efterafgrøde	højde
		cm
	20-jul	40
	04-aug	37
	17-aug	23
	ingen	0



# HortiAdvice Knoldselleri og grøngødning

---

2017	Etablering eft.afgrøde	Udbytte	Udbytte-
		knoldselleri	reduktion
		kg/ha	kg/ha
	12-aug	32.715	-11%
	ingen	36.855	

2018	Etablering eft.afgrøde	Udbytte	Udbytte-
		knoldselleri	reduktion
		kg/ha	%
	20-jul	35.100	-11,4%
	04-aug	40.500	2,3%
	17-aug	40.050	1,1%
	ingen	39.600	



# HortiAdvice Knoldselleri og grøngødning

---



22.juni  
Plantning af porre  
(Belton)



2.Juni  
Plantning af  
salat



18.Juli  
Plantning af porre  
(Pluston)



60.000 salat pr.ha  
135.000 porrer pr.ha.





<b>Porre i salat</b>	<b>udbytte</b>	<b>tykkelse</b>
	<b>tons pr.ha</b>	<b>cm</b>
Plantet 18/7 efter høst af salat i bar jord	6.315	2,2
Plantet 22/6 i salat	7.542	2,8
Plantet 22/6 på bar jord	12.414	3

135%	af udbytte plantet efter salathøst
55%	af udbytte plantet i bar jord



**HortiAdvice**

# Etablering af grøngødning i grønsager

---



























# HortiAdvice Hatzenbichler

