


Frøklider af stærk oregano afprøvet

Oregano frøklider er afprøvet i et projekt om fodring af køer, men resultaterne har også interesse for producenter af oregano til krydderurter og udvinding af æterisk olie

 Kai Grevsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, kai.grevsen@food.au.dk

 AU Food.

I 2016 blev frø af ni frøklider af oregano af typen *Origanum vulgare* ssp. *hirtum* også kaldet 'græsk oregano' indkøbt fra Danmark, Tyskland og Canada. I forbindelse med det såkaldte MET-ANO-projekt om at fodre økologiske malkekøer med stærk oregano for at nedsætte udledning af metan blev frøklider af oregano afprøvet ved henholdsvis AU Food Årslev og af Nissen Consult. Oregano til køer virkede desværre ikke på metanudledning, men resultaterne af afprøvningen er interessante for dyrkning som krydderurter og for produktion af æterisk olie.



Origanum vulgare ssp. *hirtum* har hvide blomster og et højt indhold af æterisk olie.

Konklusionen

Syv af de afprøvede ni frøklider var næsten ens og havde et meget højt udbytte og en høj koncentration af olie i planten. To frøklider var fejlleveret og ikke *Origanum vulgare* ssp. *hirtum* typen men snarere vild merian med lavt olieindhold. De syv frøklider var til gengæld alle velegnet til dyrkning af stærk oregano både på friland og i potter i væksthus og på containerplads. De syv frøklider har desuden potentiale til dyrkning for at udvinde æteriske olier.

Læs mere på www.gartner Tidende.dk under 'Faglig dybde'.

maj 2016 og høstet ved to høsttider henholdsvis ved 50 procent åbne blomster og nær 100 procent åbne blomster. Høstperioden strakte sig fra august til midt september.

Hele planten blev høstet 10 cm over jorden med en græsparcelhøster og derefter tørret ved 30°C. Tørstofudbytte blev målt, og i prøver blev der målt olieindhold og tørstof.



Nye muligheder i øko grønsagsædskeer

Interessen for at høre om det nyeste inden for forskning i plantebaserede gødninger, efterafgrøder og dyrkningssystemer i økogrønsager var stor, da AU-Årslev holdt Åbent Avlermøde


 Stig F Nielsen

faglige emner, så der var kun tale om 'nedslag' i nogle af delprojekterne. Jørrn Nygaard Sørensen fremlagde resultater fra DoubleCrop, hvor man søger at finde efterafgrøder, som er velegnede til at blive etableret efter en forholdsvis grøn grønsagsafgrøde. Blandt konklusionerne var, at vinterraps og klinte er mere effektive som fangafgrøder end vintervikke/vinterrug og vinterhøstebønne. Generelt reduceres fangafgrødens op-

Mødelokalet Rosen på Forskningscenter Årslev var fyldt til bristepunktet, da forskere fra Institut for Fødevarer afholdt Åbent Avlermøde den 5. marts 2019. Knapt 40 konventionelle og økologiske landmænd, studerende, konsulenter indenfor rådgivning og frøbranchen samt øvrige interesserede kunne her høre nyt fra tre omfattende økoprosjekter: DoubleCrop, SoilVeg og SureVeg.

Fangafgrøde skal etableres tidligt

Gruppenleder Hanne L. Kristensen ledede dagen, hvor indlæggende primært omhandlede såtidforsøg med efterafgrøder, gødningseffekter, dobbelt dyrkning og plantebaserede gødninger og knivtrotling af dækafgrøder. Dagen sluttede af ude i forsøgsmarken, hvor der blev fremvist en række forskellige overvintrende grønsager. De tre projekter arbejder med mange



Forsøgstekniker Astrid Bergmann gennemgik forskellige grønsagers egnethed som overvintrende afgrøder ude i forsøgsmarken, som er en del af DoubleCrop-forsøget.

tagelse af kvælstof med 2-4 kg pr. dag, etableringen udsættes, og efterafgrøder sået medio september har kun en lille effekt på N-udvaskningen.

Muligt at producere 400 kg N

Et andet delprojekt under DoubleCrop er undersøgelse af gødningseffekten af grøn henholdsvis blå grønmasse. Otte forskellige bælgplanter er etableret medio august og høstet året efter på tre forskellige udviklingsstadier til brug som mobil grøngødning. Formålet er at måle, hvor meget kvælstof de kan samle op i løbet af sæsonen. Resultaterne viser, at man kan producere mere end 400 kg N pr. ha pr. år med mobil grøngødning. Kvaliteten af grøngødningen kan styres ved høsttidspunktet.

Blandt de afprøvede arter er gulerødder, spidskål, spinat, vinterkarse, hvidløg og stikløg samt vintersalat.



11-14 Juni 2019

FlowerTrials®
where plants meet people

Det internationale event for udplantnings- og potteplanter, som afholdes på mere end 31 adresser i Holland og Tyskland.

Ikke mindre end 62 virksomheder indenfor segmentet for potteplanter og udplantningsplanter glæder sig til at præsentere deres innovative, kreative koncepter og et imponerende udvalg af plantesortimenter. Fra teknisk information til detaljinspiration, fra forædlingsgenembrud til de sidste nye trends - enhver professionel inden for blomster og pryddplanter har en god grund til at opleve FlowerTrials®.

 **Tilmeld dig online**
Se en oversigt over de deltagende virksomheder, find vej, og tilmeld dig gratis på www.flowertrials.com

www.flowertrials.com

Man kan opnå højt N-indhold og lavt C/N forhold ved hyppige slået.

En sammenligning af virkningen af mobil grøngødning med hønsegødning viser, at mobil grøngødning virker på niveau med hønsegødningen.

Mobil grøngødning kan anvendes som frisk, som ensilage eller som tørrede piller. Ensilagen kan med fordel anvendes som gødningskilde ved grundgødskningen om foråret, hvor den friske grøngødning endnu ikke er tilgængelig. De tørrede piller giver en stor arbejdsmæssig lettelse men er betydelig dyrere at bruge.

Sammenligning mellem tre forskellige blå biomasser - søsalat, blæretang og grøde - viste, at søsalat virker på niveau med hønsegødning, grøde lidt dårligere, mens blæretang, som har et højt C/N-forhold, virker dårligere end ingen gødning.

Forsøg ude i praksis

Udover DoubleCrop-forsøgene på Årslev ligger der forsøg og demonstrationer ude ved et par økologiske producenter.

Konsulent Richard de Visser, HortiAdvice, og Lars Skytte, Skyttes Gartneri, gav eksempler på nogle af forsøgene blandt andet etablering af grøngødningsaf-

grøder imellem grønsagerne for på den måde at forlænge deres vækstperiode og dermed deres N-optag.

I 2018 gav etablering af grøngødningsafgrøden den 20. juli et mindre udbytte i knoldselleri, mens etablering primo og medio august ikke påvirkede udbyttet.

Der er mange praktiske udfordringer både med at få etableret efterafgrøden mellem grønsagerne og med at høste afgrøden uden at ødelægge efterafgrøden, så her er et stort behov for nye innovative teknologiske løsninger.

Flere salgsenheder med DoubleCrop
I DoubleCrop sammenligner man to dyrkningssystemer:

- Et økologisk standardssystem med én salgsafgrøde pr. år bortset fra salat: byg + kløvergræs, hvidkål, knoldselleri, porrer og salat (to hold). Gødsket med gylle, fjermel og hønsegødning.
 - DoubleCrop, som er meget mere udfordrende med hensyn til ergonomi, maskiner med videre: kløvergræs, spidskål/sommerhvidkål, knoldselleri, salat/porre og løg/salat. Gødsket udelukkende med plantebaserede gødninger.
- Post doc Margita Hefner viste resultater af udbytter i tons henholdsvis salgsenheder fra to år, samt tal som sammenligner N-indholdet i jorden ned i to en halv

Udover at mindske udvaskningen af næringsstoffer giver en overvintrende grønsag - måske - mulighed for at producere en meget tidlig salgsafgrøde, her spidskål i flere sorter under fiberdag.

meters dybde i de to systemer. Derudover blev der vist tal, som beskriver den mikrobielle aktivitet i jorden.

Blandt Margita Hefners konklusioner efter de to første år er, at det er svært at sammenligne de to sædskifter, men man får flere salgsenheder i DoubleCrop-systemet. Udbytterne opgjort i vægt i DoubleCrop svarer til standarden eller er højere - hvis man ser bort fra hvidkål i det første år. Dyrøgødningen kan erstattes af plantebaserede gødninger, og der er kun få forskelle i kvælstofindholdet i jorden. Der er en tendens til, at der er en højere mikrobiel aktivitet i DoubleCrop.

Knivtromling giver udfordringer

SoilVeg-projektet er afsluttet og er under afrapportering. Her undersøgte man, om knivtromling af en vinterafgrøde, hvor man efterfølgende etablerer

De tre projekter

- DoubleCrop (2017-2020): Intensivt økologisk dyrkningssystem som ved hjælp af dobbelt dyrkning, plantebaserede gødninger og vinterjorddække skal standse brug af konventionel gødning, mindske tab af næringsstoffer og øge produktiviteten.
- SoilVeg (afsluttet, under afrapportering): Efterafgrøder behandles med knivtromle, hvorefter afgrøden etableres direkte i plantemassen for på den måde at reducere jordbejævnings og samtidigt opret-holde kvalitet og udbytte med en mindre indsats af kvælstof, brændstof med videre.
- SureVeg (2018-2021): Intensivt økologisk dyrkningssystem med samdyrkningsystemer og gødningsstrategier med vægt på biodiversitet, recirkulering af næringsstoffer og jordens frugtbarhed.

Sæt kryds i kalenderen

Torsdag den 27. juni 2019 afholder Institut for Fødevarer, AU Årsløv, Åbent Hus i forsøgsmarkerne, hvor der vil være fremvisning af forsøg under projekterne DoubleCrop og SureVeg samt det nye SoilCom.

ENGEL WORKWEAR

Galaxy



F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev · Tlf. 7422 3510 · Fax 7422 3519 · www.engel.eu



MED NATURENS EGNE RESURSER FOR STØRRE SUCCES

ESTA® Kieserit

15,1 % Mg · 20 % S



Se mere på www.kali-gmbh.com

K+S KALI GmbH

En virksomhed i K+S-koncernen

