

Diminution de la tourbe dans la production de plantons



Nouvelle | 26.07.2022

La production conventionnelle continue en règle générale à utiliser des mélanges avec 100% de tourbe, et en agriculture biologique certains mélanges affichent encore 70% de tourbe. Dans le cadre d'une déclaration d'intention convenue avec l'OFEV au sujet de la réduction de la tourbe (signée entre autres par Bio Suisse et l'UMS), il est maintenant convenu que la branche veut dans un premier temps diminuer la quantité de tourbe dans les substrats pour la production de plantons maraîchers à un maximum de 40 pourcents d'ici 2028.



[\(/fileadmin/_processed_/4/6/csm_Jungpflanzen-FiBL_vieweger-1200_3579c48138.jpg\)](#)

Diminution de la tourbe dans un substrat pour plantons maraîchers. (Photo: FiBL, Ania Vieweger)

Le Conseil fédéral avait émis il y a dix ans un signal clair avec le «plan d'abandon de la tourbe» approuvé par le Parlement, mais les objectifs qu'il décrit sont encore loin d'être atteints jusqu'à aujourd'hui.

L'utilisation de la tourbe a un impact sur le climat

Bio Suisse s'est en outre donnée ce printemps l'objectif d'être climatiquement neutre d'ici 2040. Ce qui remet sous les feux de la rampe l'utilisation de la tourbe dans les substrats pour les plantons maraîchers bio. Elle est encore incontournable pour la production de plantons maraîchers à cause des exigences de la production des mottes pressées (par exemple pour pouvoir utiliser les planteuses usuelles).

Comment peut-on réduire la tourbe dans le maraîchage bio?

Cette année, le congrès d'échanges d'expériences sur le thème des légumes et pommes de terre bio du FiBL se déroulera le trois août. Plusieurs intervenantes et intervenants de la recherche, de la vulgarisation et de la pratique venant de Suisse et de l'étranger chercheront à donner des réponses à diverses questions : Par quoi remplacer la tourbe? Quelles exigences les substrats contenant moins de tourbe posent-ils aux entreprises

marâchères? Comment les petits producteurs peuvent-ils produire eux-mêmes des substrats sans tourbe? À quoi en est la diminution de la tourbe en Allemagne et quels enseignements peut-on en tirer pour la Suisse?

Anja Vieweger et Samuel Hauenstein, FiBL

Pour en savoir plus:

FiBL- Erfahrungsaustausch Biogemüsebau und Kartoffeln am 3. August 2022 (</actualites/agenda/calendrier/erfahrungsaustausch-biogemuesebau-1>). (en Allemand)

Réduction de l'usage de tourbe dans les cultures horticoles (</cultures/plantes-ornementales-bio/reduction-de-lusage-de-tourbe>). (Rubrique Cultures)

[!\[\]\(a03a7eb2f4046e1d3c76772003e549ea_img.jpg\) Reduction de l'utilisation de la tourbe](#)

(<https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/abandon-de-la-tourbe.html>)

(BAFU)

Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.

Pour en savoir plus
Boutique du FiBL



(<https://advertising.fiblservers.com/adserver/w>
<https://advertising.fiblservers.com/adserver/w>
bannerid=106&zoneid=179&sig=2715a60cbannerid=28606c1807814831875a1398416z

