

19.09.2023

## Prévention des parasites par la pâture mixte

En agriculture biologique, l'utilisation des vermifuges est autorisée après l'identification préalable des parasites et sur ordonnance vétérinaire. Il est cependant souhaitable de réduire le plus possible l'utilisation des médicaments en agriculture biologique et de miser sur des mesures préventives, par exemple en adaptant la gestion des pâturages.



[\(/fileadmin/\\_processed\\_/8/b/csm\\_Mischweide\\_SinaBoehler\\_1200\\_4f3c08d103.jpg\)]((/fileadmin/_processed_/8/b/csm_Mischweide_SinaBoehler_1200_4f3c08d103.jpg))

*Mélanger au pâturage des bœufs d'engraissement d'âges différents peut contribuer au contrôle des parasites. Photo: Sina Böhler*

### Interlocuteur



### FiBL

Daniel Böhler  
Vulgarisation  
FiBL  
Oberer Berghof  
5465 Mellikon

[☎ 056 243 18 37](tel:+41562431837)(tel:+4

Pendant leur première saison de pâture, les bovins sont encore sensibles et des infections peuvent provoquer des diminutions de performances et de l'amaigrissement. Les bovins développent au plus tard à la fin de leur deuxième saison de pâture une bonne immunité contre les parasites gastro-intestinaux et les vers pulmonaires. Il faut pour cela un contact suffisant avec les parasites en étant au pâturage.

### Avantage des troupeaux multi-âges

Les exploitations d'engraissement au pâturage ou d'élevage ont souvent des bovins de plusieurs catégories d'âge. Elles sont généralement séparées aussi pour la pâture. Si les catégories d'âge allaient ensemble au pâturage, les animaux plus âgés et en grande partie déjà immunes pourraient assumer la fonction de «filtres à vers». En effet, ils ingèrent des larves de parasites qui se trouvent dans les pâturages, mais ils n'excrètent que très peu d'œufs et le cycle serait en majeure partie interrompu. Dans les groupes composés uniquement de jeunes bovins dont c'est le premier été au pâturage, chaque animal peut fonctionner comme multiplicateur et l'infection peut ainsi «s'autoalimenter» au cours de la saison.

### Des expériences prometteuses

Dans une étude de cas de deux ans financée par le canton d'Argovie, des bœufs d'engraissement en premier été ont depuis le début été systématiquement élevés et mis au pâturage avec des bœufs en deuxième et même troisième saison de pâture. Les plus jeunes bœufs ont certes été infectés, mais, contrairement aux années précédentes, il n'a pas été nécessaire de les vermifuger. Ces résultats doivent toutefois être pris avec

Mobile 076 375 52 00

@ [Courriel](mailto:Courriel)

🔗 [www.fibl.org](http://www.fibl.org)

(<http://www.fibl.org/>)

## Interlocuteur



**FiBL**

Steffen Werne

Élevage d'animaux

FiBL

Ackerstrasse 113

5070 Frick

☎ [062 865 04 51](tel:+410628650451)(tel:+4

précaution vu qu'il s'agit d'une étude de cas sans contrôle.

*Steffen Werne, Daniel Böhler, FiBL*

@ [Courriel](#)

🔗 [www.fibl.org](http://www.fibl.org)

(<http://www.fibl.org/>)

## Pour en savoir plus


**[Maîtriser durablement les parasites des pâturages chez les bovins \(/production-animale/bovins/maitrise-parasites-paturages\)](#)** (Rubrique Élevages)

**[Diminuer les parasitoses par une bonne gestion des rotations des pâturages \(/production-animale/bovins/rotation-paturage\)](#)** (Rubrique Élevages)

---

Dernière mise à jour de cette page: 24.02.2023

## Cela pourrait aussi vous intéresse



**Mise à mort à la ferme – moins de stress, plus de bien-être animal (/production-animale/elevage-en-general/abattage/mise-a-mort-a-la-ferme)**

---



**La Journée suisse du Bétail Bio (/journee-du-betail-bio)**

---



**Prendre soin des bousiers : Repenser sa gestion des parasites internes chez les bovins (/production-animale/bovins/garde-bovins/prendre-soin-des-bousiers)**

---



**Les plantes médicinales dans la pratique (/production-animale/sante-animale/plantes-medicinales)**

---

