Vergleich mehrerer Saattermine bei Weißen Lupinen

Urbatzka P¹, Dörfel U² & Winterling A¹

Einleitung und Zielsetzung

- Mitte der 1990er Jahre weitestgehende Aufgabe des Anbaus der Weißen Lupine aufgrund Anthraknose (*Colletotrichum lupini*)
- 2019 Zulassung von zwei anthraknosetoleranten Sorten
- Als spätreifende Kultur stellt sich für Weiße Lupinen analog zu Soja die Frage nach der richtigen Saatzeit und noch rechtzeitiger Abreife
- Ziel: Bestimmung der Auswirkung verschiedener Saattermine

Methoden

- Feldversuch zur Ernte 2020 in Puch (sL, Parabraunerde, langjährige Mittel 856 mm und 8,9 °C, Oberbayern) mit einer zweifaktoriellen Blockanlage (N = 4)
- Zwei Faktoren: Sorte (cvs. *Celina* und *Frieda*) und Saatzeit (19.3., 16.4. und 11.5.)
- Saatstärke: 60 keimfähige Körner je m² in 3 m breite Parzellen mit Kerndrusch auf 1,5 m Breite.
- Vorfrucht Mais, Vorvorfrucht Winterweizen

Ergebnisse und Diskussion

- Bei Saat Mitte Mai erwartungsgemäß schneller Feldaufgang analog zu Soja (Urbatzka et al. 2019): mit knapp zwei Wochen deutlich schneller als bei früherer Saat mit etwa drei bis vier Wochen
- Entwicklung der Pflanzen des letzten Saattermins deutlich zeitverzögert im Vergleich zu den früheren Saaten (Abb. 1, Tab. 1)
- Ernte der Pflanzen zu den Saatterminen im März und April am 9.9.20: aufgrund unzureichender Abreife kein Drusch der Pflanzen des drittens Saattermins möglich; dieser Saatzeitpunkt ist auch bei Soja risikoreich (Urbatzka et al. 2019)
- Ursache: starke Reifeverzögerung des Strohs, Hülsen hatten durchaus Druschreife (Abb. 1, Tab. 1)
- Korn- und Rohproteinertrag nach Saat im März höher als nach Saat im April; dagegen höherer Rohproteingehalt nach Saat im April vermutlich aufgrund des geringeren Kornertrages (Tab. 2)
- *Celina* analog zur Einstufung des Bundes-sortenamtes (2023) höhere Erträge als *Frieda*

Schlussfolgerungen

- Saat Mitte Mai unter südbayerischen Bedingungen zu spät für eine sichere Abreife bei Weißer Lupine
- Saat Mitte März zumindest einjährig höheres Ertragspotenzial als Saat Mitte April

Literatur

Bundessortenamt (2023): Beschreibende Sortenliste 2022. ISSN 2190-6130.

Urbatzka P., Jobst F., Kimmelman S. (2019): Leistungsfähigkeit von Soja in Abhängigkeit der Saatzeit. Beiträge zur 15. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 86-89.

Abb. 1: Verschiedene Entwicklung der Saattermine am 8.7. (oben); vorne bereits geerntet, hinten Saatzeit im Mai am 17.9. (unten)

Tab. 1: Entwicklungsstadien und Bonituren in Abhängigkeit der Saatzeit

	Entwicklungsstadium ¹			Abreifegrad Hülsen ²	Reifeverzögerung Stroh ²
	31.5.	22.6.	2.7.	2.10.	2.10.
Mitte März	61	67	69	-	-
Mitte April	15	65	67	-	-
Mitte Mai	11	15	17	2,5	6,0

¹ BBCH, ² Noten von 1-9, wobei 1 = geringer Wert

Tab. 2: Ertrag, Qualität und Bonituren in Abhängigkeit der Saatzeit und Sorte

	Kornertrag (dt/ha)	RP-Ertrag (dt/ha)	RP-Gehalt (% TM)	Massenbildung ¹ (22.6.)	Unkrautdeckungsgrad (%; 22.6.)	Lager vor Ernte ¹
Mitte März	48,8 A	15,8 A	37,6 B	7,9 A	10,6 B	5,9 A
Mitte April	36,0 B	12,2 B	39,6 A	5,2 B	42,5 A	7,2 A
Mitte Mai^o				2,0 C	6,9 B	2,5 B
Celina	46,4 a	15,2 a	38,2 ns	4,9 ns	17,5 ns	5,0 ns
Frieda	38,5 b	12,8 b	39,0	5,1	22,5	5,4

verschiedene große bzw. kleine Buchstaben = signifikante Unterschiede für Saatzeit bzw. Sorte (SNK- bzw. Wilcoxon-Test bei Bonituren, p < 0,05); ¹ Noten von 1-9, wobei 1 = geringer Wert; ^o keine Ernte möglich (siehe Tab. 1)