

La biodiversité dans les champs - poser les jalons maintenant

 Nouvelle | 02.02.2026

C'est quand les champs sont au repos que le moment est idéal pour planifier des mesures qui apporteront une nouvelle vitalité et diversité en période de végétation. En plus des surfaces de promotion de la biodiversité sur terres assolées déjà établies, les grandes cultures bio offrent de nombreuses possibilités d'encourager la biodiversité directement dans les surfaces de production: renoncement aux produits phytosanitaires, modification des techniques agricoles – par exemple opter pour le travail réduit du sol, les cultures associées ou en bandes.



La flore adventice dans les grandes cultures (photo: grémil des champs) joue un rôle important pour la biodiversité. Photo: Julia Fürst

Choisir des emplacements favorables et des mesures adéquates est décisif pour la réussite de l'encouragement ciblé de la biodiversité. Les sites de grandes cultures qui fournissent des rendements moins abondants conviennent particulièrement bien pour favoriser la flore messicole dans les grandes cultures au moyen de bandes culturales extensives. Les peuplements spontanés de coquelicots et de bleuets peuvent être de bons indicateurs.

Aménager judicieusement des zones non-utilisées et repenser les parcelles

Sur les surfaces de céréales déjà en place, un sous-semis effectué au printemps peut diminuer la pression des mauvaises herbes. Par contre, si la parcelle présente un bon potentiel pour la flore messicole, il vaut mieux ne rien semer.

Les parcelles non-rectangulaires peuvent être rectifiées et les surfaces restantes utilisées comme SPB pluriannuelles sur terres assolées. Encore un point dont il faut tenir compte: Peut-être que certaines surfaces se trouvent à l'intérieur de zones sensibles pour des espèces menacées. Dans ces endroits, des mesures spécifiques comme les céréales en ligne de semis espacés ou encore les jachères tournantes ou florales sont possibles.

L'art de la combinaison

L'introduction progressive de nouvelles mesures permet de limiter les risques et d'acquérir de l'expérience. Combiner des mesures temporaires avec des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) pluriannuelles s'avère précieux pour l'équilibre de l'écosystème.

Une nouvelle vidéo sur l'encouragement de la flore messicole dans les grandes cultures présente des expériences venant de la pratique.

Theres Rutz, FiBL

Pour en savoir plus

[!\[\]\(6a9b39b98eb945faa14c645ec99e4eaa_img.jpg\) Film "Bandes culturales extensives – expériences pratiques et avantages pour la biodiversité"](#)

(Youtube, allemand avec sous-titres français)

[Biodiversité: terres assolées](#) (rubrique Durabilité)

[!\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d_img.jpg\) Plateforme d'informations sur la promotion de la biodiversité en agriculture - Agrinatur](#)

(agrinatur.ch)

Interlocutrice



FiBL

Theres Rutz
Biodiversité
FiBL
Ackerstrasse 113
5070 Frick

☎ [062 865 63 65](tel:0628656365)

@ [Courriel](#)

🔗 www.fibl.org

Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.